

Tabla 2. Resumen de los riesgos infecciosos asociados a FAME sintéticos dirigidos²⁶.

Fármaco	TBC	Herpes zóster	VHB	Otras infecciones virales	PPJ	COVID-19	Valoración previa al tratamiento	Valoración durante el tratamiento	Otros riesgos relevantes
Inhibidor PDE4 Apremilast	No	No	No	ND	ND	ND	No es necesario cribado de tuberculosis.	Sin pruebas específicas.	Alteración del estado de ánimo. Pérdida de peso. Eventos cardiovasculares graves.
Inhibidores JAK Abrocitinib Baricitinib Filgotinib Tofacitinib Upadacitinib	SI	SI	SI	CMV PML EBV	SI (en presencia de otros factores de riesgo*)	ND	Historia previa infecciones. Estado vacunación (sarampión, rubeola, parotiditis, varicela). Inmunización VHB. Cribado tuberculosis. Descartar infección sistémica o local.	Suspender si infección activa hasta su resolución. Las vacunas atenuadas están contraindicadas. Interrumpir el tratamiento 7 días antes de una cirugía programada.	TVE (TVP y EP). Alteraciones hematológicas. Eventos cardiovasculares graves. Neoplasias malignas. EPI Perforación GI

TBC: Tuberculosis
VHB: Virus hepatitis B
PPJ: Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*
PDE4: Fosfodiesterasa-4
ND: No determinado
JAK: Quinasas Janus
CMV: Citomegalovirus

PML: Encefalopatía multifocal progresiva
EBV: Virus Epstein-Barr
TVE: Tromboembolismo venoso
TVP: Trombosis venosa profunda
EP: Embolismo pulmonar
EPI: Enfermedad pulmonar intersticial
GI: Gastrointestinal

(*) Factores de riesgo: tratamiento previo o concomitante con corticoides, recuentos bajos de linfocitos, inhibidor de JAK a dosis altas²⁶.