

# ▼ TOVEDESO®

## DESFESOTERODINA EN EL SÍNDROME DE VEJIGA HIPERACTIVA

### Rentabilizando la fesoterodina



IMPORTANTE MEJORA TERAPÉUTICA



MODESTA MEJORA TERAPÉUTICA



SÓLO APORTA EN SITUACIONES CONCRETAS



NO SUPONE AVANCE TERAPÉUTICO



INFORMACIÓN INSUFICIENTE

+ FICHA TÉCNICA

### ¿QUÉ ES?

Antiespasmódico urinario.

### INDICACIÓN

Síntomas del síndrome de vejiga hiperactiva.

### POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis de inicio recomendada en adultos, incluyendo ancianos, es de 3,5 mg una vez al día. La dosis máxima diaria es de 7 mg. Se recomienda reevaluar la respuesta a las 8 semanas de tratamiento. Puede administrarse con o sin alimentos.

### EFICACIA

Frente a placebo. Utiliza los datos de fesoterodina, que muestra eficacia limitada, con una reducción que no alcanza una micción sobre un promedio de 12 micciones en 24h más que el placebo.

### RIESGOS

**Reacciones adversas:** Otros efectos antimuscarínicos: boca seca, ojo seco, dispepsia y estreñimiento. Puede producir retención urinaria. **Contraindicaciones:** Retención urinaria. Retención gástrica. Glaucoma de ángulo cerrado. Miastenia gravis. Insuficiencia hepática severa. Uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4. Colitis ulcerosa grave. Megacolon tóxico. Reflujo gastroesofágico. Disminución de la

motilidad gastrointestinal. Neuropatía autónoma. Glaucoma de ángulo cerrado. En pacientes con riesgo de prolongación del QT y enfermedades cardiacas relevantes (isquemia miocárdica, arritmia, insuficiencia cardiaca congestiva).

### LUGAR EN LA TERAPÉUTICA

Por la ausencia de estudios comparativos y asimilar los datos de su profármaco fesoterodina, se considera que desfesoterodina no aporta mejoras frente a otros antiespasmódicos urinarios en el síndrome de vejiga hiperactiva.

### PRESENTACIONES

**Tovedeso® 3,5 mg** comprimidos de liberación prolongada, 28 comprimidos (TEVA PHARMA S.L.U.) 41,93€

**Tovedeso® 7 mg** comprimidos de liberación prolongada, 28 comprimidos (TEVA PHARMA S.L.U.) 67,08€

### Coste tratamiento/día (€)

OXIBUTININA (15 mg) **0,21**

TROSPPIO (40 mg) **0,36**

SOLIFENACINA (5 mg) **0,72**

TOLTERODINA (4 mg) **1,02**

PROPIVERINA (30 mg) **1,10**

FESOTERODINA (4 mg) **1,20**

DESFESOTERODINA (3,5 mg) **1,50**

MIRABEGRÓN (50 mg) **1,50**

0,00 0,50 1,00 1,50

Metabolito activo de fesoterodina. No se ha estudiado específicamente.

INFORME

