

MICTONORM®

PROPIVERINA PARA LA INCONTINENCIA URINARIA

Otro anticolinérgico, sin más.



IMPORTANTE MEJORA TERAPÉUTICA



MODESTA MEJORA TERAPÉUTICA



SÓLO APORTA EN SITUACIONES CONCRETAS



NO SUPONE AVANCE TERAPÉUTICO



INFORMACIÓN INSUFICIENTE

+
FICHA TÉCNICA

¿QUÉ ES?

Antiespasmódico urinario con propiedades antimuscarínicas.

INDICACIÓN

Tratamiento sintomático de la incontinencia urinaria y/o incremento de la frecuencia y urgencia urinarias en pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Una cápsula (30 mg) una vez al día, con o sin alimentos. Se recomienda reevaluar la efectividad a partir de las 4 semanas de tratamiento.

EFICACIA

Frente a tolterodina 4 mg: No hay diferencias de eficacia en la reducción del número de episodios de micciones en 24 horas. No inferioridad.

RIESGOS

Efectos anticolinérgicos: sequedad de boca, cefalea, trastornos de la acomodación, discapacidad visual, estreñimiento, dolor abdominal, dispepsia y fatiga.

Función hepática: pueden producirse alteraciones reversibles de los enzimas hepáticos, por lo que deben monitorizarse en tratamientos a largo plazo. No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática moderada-severa.

Precaución: en pacientes con neuropatía autonómica, insuficiencia cardíaca congestiva severa, hipertrofia prostática, hernia de hiato con reflujo esofágico, arritmias y glaucoma de ángulo cerrado. En ancianos, riesgo de deterioro cognitivo.

LUGAR EN LA TERAPÉUTICA

Eficacia y seguridad similares a tolterodina. Como otros fármacos de su grupo, sólo estaría indicado cuando las medidas no farmacológicas son insuficientes.

PRESENTACIONES

Mictonorm® 30 mg, 28 cápsulas de liberación modificada (PVP+IVA: 30,91€).

Escasa eficacia que difícilmente compensa los efectos adversos.



INFORME

COSTE TRATAMIENTO (€) / DÍA

TOLTERODINA 4 MG 1,02

PROPIVERINA 30 MG 1,10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2