

GOBIERNO DE NAVARRA
PRESIDENCIA JUSTICIA E INTERIOR
ECONOMIA Y HACIENDA
RELACIONES INSTITUCIONALES Y
PORTAVOZ DEL GOBIERNO
ADMINISTRACION LOCAL
EDUCACION

SALUD

DESARROLLO RURAL Y MEDIO
AMBIENTE
ASUNTOS SOCIALES FAMILIA
JUVENTUD Y DEPORTE
CULTURA Y TURISMO
OBRAS PUBLICAS TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
VIVIENDA Y ORDENACION DEL
TERRITORIO
INNOVACION EMPRESA Y EMPLEO
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El índice de siniestralidad laboral descendió un 7,8% en 2010

El informe provisional del Instituto Navarro de Salud Laboral cifra en 14 los fallecidos en accidentes de trabajo

Martes, 29 de marzo de 2011

El índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en Navarra (nº de accidentes por cada 1.000 trabajadores) disminuyó durante 2010 un 7,8% respecto a 2009, año en que se contabilizaron 41,5 siniestros por cada mil trabajadores, frente a 38,2 en 2010. Estos son los principales datos que recoge el [informe](#) provisional sobre siniestralidad laboral realizado por el Instituto Navarro de Salud Laboral.


Por sectores, el descenso se percibe en todas las actividades, aunque especialmente en servicios y agricultura (9% en ambos sectores), seguido de la industria (5,2%) y construcción (1,5%).

El índice de incidencia entre los trabajadores autónomos fue de 21,6, muy por debajo de 38,1 de la tasa registrada en el total de la población activa.

En términos absolutos, durante el año 2010 se produjeron en Navarra 8.500 accidentes de trabajo con baja, lo que supone un descenso respecto al periodo anterior de un 8,5% (la población activa era 224.295 trabajadores en 2009 frente a 222.425 en 2010). Hubo que lamentar 14 fallecidos por accidente laboral, 3 de ellos 'in itinere', frente a los 17 del año anterior (6 de ellos 'in itinere').

Aumentan los casos de enfermedades profesionales

Durante 2010 se comunicaron 1.507 casos de enfermedades profesionales (EP), 797 con baja y 710 sin baja, con una razón hombre



Trabajadora.

mujer de 1,5 (915 de hombres y 592 de mujeres). La proporción de los casos con baja es ligeramente superior en mujeres que en hombres (53,7% frente a 52,3%). Respecto al año 2009, estos datos suponen un aumento del 5,6% en el número de partes, del 1,4% en los partes con baja, y del 10,8% en los que no conllevan baja.

En cuanto a los diagnósticos, casi el 90% corresponden a patologías por agentes físicos; cercal del 6% a enfermedades de la piel, y en torno al 4%, a las producidas por agentes químicos.