

▼ REAGILA®

CARIPRAZINA PARA LA ESQUIZOFRENIA

Otro fármaco para la colección



No aporta ninguna ventaja sobre risperidona o aripiprazol en el tratamiento de esquizofrenia.



IMPORTANTE MEJORA TERAPÉUTICA



MODESTA MEJORA TERAPÉUTICA



SÓLO APORTA EN SITUACIONES CONCRETAS



NO SUPONE AVANCE TERAPÉUTICO



INFORMACIÓN INSUFICIENTE

+
FICHA TÉCNICA

¿QUÉ ES?

Antipsicótico.

INDICACIÓN

Tratamiento de la esquizofrenia en pacientes adultos.

POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis inicial recomendada es 1,5 mg/día. La dosis máxima es de 6 mg/día en función de la respuesta. Se puede tomar con o sin alimentos.

EFICACIA

En dos de los tres ensayos a corto plazo no se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas respecto a placebo en la tasa de respondedores (diferencia en la puntuación de PANSS* \geq 30%) cuando se empleaban dosis de cariprazina menores a 6 mg/día. En estudios que incluían comparadores activos (risperidona y aripiprazol) no se permitía aumentar las dosis de los mismos por lo que no se puede confirmar que se utilizaran dosis óptimas. No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (con todas las dosis) respecto a aripiprazol pese a que la dosis de aripiprazol no fue la más adecuada. En el control a largo plazo de la sintomatología negativa (variable secundaria), cariprazina mostró resultados ligeramente mejores sobre los síntomas negativos respecto a risperidona, pero la relevancia clínica no está clara. No se ha comparado frente a aripiprazol.

RIESGOS

Presenta más incidencia de acatisia que sus comparadores, mayor de ganancia de peso que aripiprazol pero bajo perfil de alteraciones metabólicas, hormonales (incluyendo prolactina) y de prolongación del intervalo QT. Además destacan insomnio (14%), cefalea (12%). Las reacciones adversas oftálmicas (opacidad del cristalino, visión borrosa...) están pendientes de evaluar por el plan de gestión de riesgos. **Contraindicado:** En pacientes con insuficiencia renal o hepática grave, administración concomitante de inductores e inhibidores potentes o moderados del CYP3A4. **Advertencias:** Ideas de suicidio, discinesia tardía, enfermedad de Parkinson, síndrome neuroléptico maligno, convulsiones, riesgo de accidente cerebrovascular y alteraciones cardiovasculares.


Es una alternativa terapéutica más en el tratamiento de la esquizofrenia. No presenta ventajas ni valor terapéutico añadido frente a aripiprazol ni risperidona.

LUGAR EN LA TERAPÉUTICA

Es una alternativa terapéutica más en el tratamiento de la esquizofrenia. No presenta ventajas ni valor terapéutico añadido frente a aripiprazol ni risperidona.

PRESENTACIONES

Reagila® 1,5 mg 28 cápsulas (PVP+IVA: 65,13€).
 Reagila® 3 mg 28 cápsulas (PVP+IVA: 65,13€).
 Reagila® 4,5 mg 28 cápsulas (PVP+IVA: 65,13€).
 Reagila® 6 mg 28 cápsulas (PVP+IVA: 65,13€).



(* PANSS: (Positive And Negative Syndrome Scale). Escala validada de sintomatología positiva y negativa de la enfermedad.

